


Hvað er nýrnahettukrabbamein?

Nýrnahettukrabbamein er illkynja æxli í nýrnahettum sem vex inn í nærliggjandi heilbrigðan vef og truflar starfsemi vefjarins.

Nýrnahettukrabbamein getur komið fram á öllum aldri en kemur oftast fram hjá fólki á aldrinum 40 til 70 ára.



Hverjar eru afleiðingar nýrnahettukrabbameins?

1

Einkenni sem stafa af stærð æxlisins eða vegna íferðar og þrýstings á aðra vefi



Verkur.



Ógleði og uppköst.



Mæði.



Erfiðleikar við hægðalosun.


2

Einkenni vegna offramleiðslu hormóna

Kortisól → Einkenni Cushings heilkennis



Dæmigerð fitudreifing.




Húðslit.



Minnkuð vöðvaspenna.



Andlitíð verður kringlótt og þrútið (tunglandlit, eða moonface)



Hár blóðþrýstingur.



Þunn húð. Marblettir.




Preytutilfinning.



Vitsmunaskerðing og geðsvieflur.

Aldósterón

→ Einkenni frumkomins aldósterónheilkennis




Vöðvakrampar.



Hár blóðþrýstingur.



Höfðoverkur.



Hjartsláttarónot.



Lág blóðgildi kalúums.

Andrógen

→ Einkenni of mikillar andrógenframleiðslu



Aukinn hárvöxtur.



Óhófleg svitamyndun.




Prymlabólur.



Vandamál tengd tiðablæðingum.



Dýpri rödd.



Skert frjósemi.

Hvernig er nýrnahettukrabbamein greint?

Heimilislæknir eða sérfræðingur í lyflækningum metur sjúklinginn með hliðsjón af einkennum

Hugsanlega getur verið um nýrnahettukrabbamein að ræða

Göngudeild sjúkrahúss

Sérfræðingur í lyflækningum (innkirtlasérfræðingur)

Rannsóknir til að leita eftir
æxli í nýrnahetu.

1 Gangið úr skugga um hvort um illkynja æxli er að ræða




- staðsetning,
stærð og
útbreiðsla æxlis
- meinvörp




- meinafræðingur
framkvæmir
vefjagreiningu á
æxlinu

2 Gangið úr skugga um hvort offramleiðsla hormóna er til staðar



- blóðrannsóknir
og
þvagrannsóknir
til að meta
hvort um
offramleiðslu
kortisóls,
andrógena og
aldósteróns er
að ræða



Meðferð

Hvernig er nýrnahettukrabbamein meðhöndlað?

1

Fjarlægið æxlið með aðgerð ef þess er kostur.

2

Lyfjagjöf til að hægja á offramleiðslu hormóna.

Eftir aðgerð

Gangið úr skugga um að æxlið hafi verið fjarlægt að fullu

Ef þörf krefur.

Eftirméðferð með mítótani (lyf)

Geislun

Krabbameinslyfjameðferð

Eftirfylgni

Athuganir á virkni nýrnahetta (annarrar eða beggja).

Er kortisól- eða aldósterónskortur til staðar? Gefið uppbótarmeðferð með þessum hormónum.

Framkvæmið myndatökur með reglulegu millibili.

Fylgist með hvort offramleiðsla hormóna er til staðar.

Rannsóknir á blóði, þvagi eða munnavatni.

Æxli kemur aftur

Ef æxli kemur aftur eða ef um meinvörp er að ræða.

Æxlið fjarlægt á ný með aðgerð ef þörf krefur, eða meðferð með mítótani eða krabbameinslyfum.